


上部消化管X線検査


性別	年齢	受診者数	正常者数 A・B判定(%)	経過観察者数 C0～C12判定(%)	要精検者数 D・E判定(%)	治療中 F判定(%)
男性	39歳以下	1,170	847 (72.4)	317 (27.1)	6 (0.5)	0
	40-49歳	2,480	1,532 (61.8)	918 (37.0)	30(1) (1.2)	0
	50-59歳	2,554	1,263 (49.5)	1,222 (47.8)	68(1) (2.7)	1 (0.04)
	60-69歳	1,281	502 (39.2)	728 (56.8)	51(1) (4.0)	0
	70歳以上	396	135 (34.1)	239 (60.3)	22 (5.6)	0
女性	39歳以下	642	405 (63.1)	226 (35.2)	11 (1.7)	0
	40-49歳	1,656	828 (50.0)	816 (49.3)	12 (0.7)	0
	50-59歳	1,615	666 (41.2)	928 (57.5)	21 (1.3)	0
	60-69歳	693	228 (32.9)	444 (64.1)	21(1) (3.0)	0
	70歳以上	200	60 (30.0)	137 (68.5)	3 (1.5)	0
計		12,687	6,466 (51.0)	5,975 (47.1)	245(4) (1.9)	1 (0.01)

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は12,687人、このうち要精検者数は245人(1.9%)、治療中は1人(0.01%)でした。



受診者数は12,687人、このうち有所見者数は6,406人(50.5%)。男女とも加齢とともに有所見率が増加しています。



赤字はがん発見数

上部消化管X線検査で、4人の胃がんが発見されました。

上部消化管X線検査における要受診・要経過観察所見

部位	所見	男性 7,881人		女性 4,806人		合計 12,687人	
		要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)	要受診(%)	経過観察(%)
食道	食道炎	5 (0.06)	24 (0.3)	0	7 (0.2)	5 (0.04)	31 (0.2)
	食道びらん	0	0	0	0	0	0
	食道潰瘍	6 (0.08)	0	4 (0.08)	0	10 (0.08)	0
	食道潰瘍癒痕	1 (0.01)	0	1 (0.02)	0	2 (0.02)	0
	食道陥凹性病変	3 (0.04)	0	0	0	3 (0.02)	0
	食道ポリープ	2 (0.03)	33 (0.4)	3 (0.06)	18 (0.4)	5 (0.04)	51 (0.4)
	食道粘膜下腫瘍	1 (0.01)	4 (0.05)	1 (0.02)	1 (0.02)	2 (0.02)	5 (0.04)
	食道隆起性病変	18 (0.2)	6 (0.08)	3 (0.06)	1 (0.02)	21 (0.2)	7 (0.06)
	食道裂孔ヘルニア	1 (0.01)	105 (1.3)	0	28 (0.6)	1 (0.01)	133 (1.1)
	胃食道逆流症	0	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)
	アカラシア	0	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)
	食道静脈瘤	0	0	0	0	0	0
胃	早期胃がん	1(1) (0.01)	0	0	0	1(1) (0.01)	0
	胃炎	0	1,375 (17.5)	0	553 (11.5)	0	1,928 (15.2)
	萎縮性胃炎	0	30 (0.4)	0	12 (0.3)	0	42 (0.3)
	化生性胃炎	0	1 (0.01)	0	0	0	1 (0.01)
	胃びらん	0	0	0	0	0	0
	胃潰瘍	19 (0.2)	2 (0.03)	5(1) (0.1)	0	24(1) (0.2)	2 (0.02)
	胃潰瘍癒痕	27 (0.3)	23 (0.3)	15 (0.3)	4 (0.08)	42 (0.3)	27 (0.2)
	胃陥凹性病変	16 (0.2)	1 (0.01)	4 (0.08)	0	20 (0.2)	1 (0.01)
	胃ポリープ	5 (0.06)	1,531 (19.4)	2 (0.04)	1,819 (37.9)	7 (0.06)	3,350 (26.4)
	胃粘膜下腫瘍	16(2) (0.2)	36 (0.5)	9 (0.2)	27 (0.6)	25(2) (0.2)	63 (0.5)
	胃腺腫	0	0	0	0	0	0
	胃隆起性病変	38 (0.5)	6 (0.08)	17 (0.4)	3 (0.06)	55 (0.4)	9 (0.07)
	胃硬化像	6 (0.08)	6 (0.08)	2 (0.04)	3 (0.06)	8 (0.06)	9 (0.07)
	胃巨大粘膜ひだ	0	4 (0.05)	0	0	0	4 (0.03)
十二指腸	十二指腸びらん	0	0	0	0	0	0
	十二指腸潰瘍	0	0	1 (0.02)	0	1 (0.01)	0
	十二指腸潰瘍癒痕	2 (0.03)	134 (1.7)	0	49 (1.0)	2 (0.02)	183 (1.4)
	十二指腸ポリープ	2 (0.03)	13 (0.2)	0	12 (0.3)	2 (0.02)	25 (0.2)
	十二指腸粘膜下腫瘍	0	0	0	0	0	0
	十二指腸腫瘍	0	0	0	0	0	0
	十二指腸隆起性病変	0	3 (0.04)	1 (0.02)	0	1 (0.01)	3 (0.02)
	リンパ過形成(十二指腸)	0	7 (0.09)	0	5 (0.1)	0	12 (0.09)

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は12,687人、このうち男性7,881人、女性4,806人でした。所見としては、男性女性共に胃ポリープが最も多く、男性1,536人(19.5%)、女性1,821人(37.9%)が認められました。


上部消化管X線検査受診者のうち、がん発見数は4人(0.03%)で、すべて胃がんでした。

上部消化管内視鏡検査

性別	年齢	受診者数	正常者数 A・B判定(%)	経過観察者数 C0~C12判定(%)	要精検者数 D・E判定(%)	判定不能 Z判定(%)
男性	39歳以下	353	170 (48.2)	181 (51.3)	2 (0.6)	0
	40-49歳	1,341	498 (37.1)	831 (62.0)	12 (0.9)	0
	50-59歳	1,608	443 (27.5)	1,147 (71.3)	18(3) (1.1)	0
	60-69歳	1,058	186 (17.6)	857 (81.0)	15(2) (1.4)	0
	70歳以上	723	76 (10.5)	623 (86.2)	24(7) (3.3)	0
女性	39歳以下	237	122 (51.5)	114 (48.1)	1(1) (0.4)	0
	40-49歳	885	351 (39.7)	531 (60.0)	3 (0.3)	0
	50-59歳	1,041	351 (33.7)	684 (65.7)	4 (0.4)	2 (0.2)
	60-69歳	612	140 (22.9)	465 (76.0)	7(2) (1.1)	0
	70歳以上	331	53 (16.0)	273 (82.5)	5 (1.5)	0
計	8,189	2,390 (29.2)	5,706 (69.7)	91(15) (1.1)	2 (0.02)	

赤字はがん発見数

上部消化管内視鏡検査の受診者数は8,189人、このうち男性5,083人、女性3,106人でした。要精検者数は男性71人(1.4%)、女性20人(0.6%)、計91人(1.1%)でした。がん発見数は15人(0.18%)で、食道がん3人、胃がん11人、悪性リンパ腫1人でした。



受診者数は8,189人、このうち有所見者数は5,797人(70.8%)。70歳以上の男性の有所見率(89.5%)が最も高い結果となりました。

上部消化管内視鏡検査における要受診・要経過観察所見(一次検査)

部位	所見	男性 5,083 人		女性 3,106 人		合計 8,189 人	
		要受診 (%)	経過観察 (%)	要受診 (%)	経過観察 (%)	要受診 (%)	経過観察 (%)
食道	食道がん	2(2) (0.04)	0	0	0	2(2) (0.02)	0
	食道腫瘍	1 (0.02)	0	0	0	1 (0.01)	0
	食道炎	0	4 (0.08)	0	2 (0.06)	0	6 (0.07)
	食道びらん	1 (0.02)	5 (0.1)	0	1 (0.03)	1 (0.01)	6 (0.07)
	食道潰瘍	0	1 (0.02)	0	0	0	1 (0.01)
	食道ポリープ	1 (0.02)	8 (0.2)	0	5 (0.2)	1 (0.01)	13 (0.2)
	食道粘膜下腫瘍	0	23 (0.5)	3 (0.1)	12 (0.4)	3 (0.04)	35 (0.4)
	食道隆起性病変	1 (0.02)	7 (0.1)	0	0	1 (0.01)	7 (0.09)
	食道裂孔ヘルニア	0	468 (9.2)	0	162 (5.2)	0	630 (7.7)
	胃食道逆流症	21 (0.4)	613 (12.1)	0	103 (3.3)	21 (0.3)	716 (8.7)
	パレット上皮	1 (0.02)	170 (3.3)	0	67 (2.2)	1 (0.01)	237 (2.9)
	食道静脈瘤	0	5 (0.1)	0	4 (0.1)	0	9 (0.1)
	食道カンジタ	0	29 (0.6)	1 (0.03)	14 (0.5)	1 (0.01)	43 (0.5)
	食道陥凹性病変	1(1) (0.02)	6 (0.1)	0	2 (0.06)	1(1) (0.01)	8 (0.1)
	食道白斑	0	7 (0.1)	0	1 (0.03)	0	8 (0.1)
胃	胃がん	2(2) (0.04)	0	0	0	2(2) (0.02)	0
	胃炎	4 (0.08)	662 (13.0)	0	290 (9.3)	4 (0.05)	952 (11.6)
	萎縮性胃炎	0	1,858 (36.6)	2 (0.06)	961 (30.9)	2 (0.02)	2,819 (34.4)
	化生性胃炎	0	60 (1.2)	0	31 (1.0)	0	91 (1.1)
	胃びらん	3(2) (0.06)	195 (3.8)	4(1) (0.1)	109 (3.5)	7(3) (0.09)	304 (3.7)
	胃潰瘍	2 (0.04)	3 (0.06)	1 (0.03)	0	3 (0.04)	3 (0.04)
	胃潰瘍瘢痕	1 (0.02)	64 (1.3)	1 (0.03)	19 (0.6)	2 (0.02)	83 (1.0)
	胃陥凹性病変	4(2) (0.08)	22 (0.4)	2(2) (0.06)	13 (0.4)	6(4) (0.07)	35 (0.4)
	胃ポリープ	2(2) (0.04)	1,207 (23.7)	1 (0.03)	1,032 (33.2)	3(2) (0.04)	2,239 (27.3)
	胃粘膜下腫瘍	2 (0.04)	186 (3.7)	1 (0.03)	150 (4.8)	3 (0.04)	336 (4.1)
	胃腺腫	0	3 (0.06)	1 (0.03)	1 (0.03)	1 (0.01)	4 (0.05)
	胃隆起性病変	2 (0.04)	19 (0.4)	0	5 (0.2)	2 (0.02)	24 (0.3)
	胃腫瘍	1(1) (0.02)	0	1 (0.03)	1 (0.03)	2(1) (0.02)	1 (0.01)
胃黄色腫	0	20 (0.4)	0	4 (0.1)	0	24 (0.3)	
十二指腸	十二指腸炎	0	49 (1.0)	0	2 (0.06)	0	51 (0.6)
	十二指腸びらん	1 (0.02)	66 (1.3)	0	15 (0.5)	1 (0.01)	81 (1.0)
	十二指腸潰瘍	4 (0.08)	0	0	1 (0.03)	4 (0.05)	1 (0.01)
	十二指腸潰瘍瘢痕	0	90 (1.8)	0	26 (0.8)	0	116 (1.4)
	十二指腸ポリープ	0	76 (1.5)	0	19 (0.6)	0	95 (1.2)
	十二指腸粘膜下腫瘍	1 (0.02)	25 (0.5)	0	6 (0.2)	1 (0.01)	31 (0.4)
	十二指腸隆起性病変	0	3 (0.06)	0	0	0	3 (0.04)
	ファーター乳頭腫大	0	2 (0.04)	0	1 (0.03)	0	3 (0.04)
十二指腸のう腫	0	23 (0.5)	0	5 (0.2)	0	28 (0.3)	

赤字はがん発見数

最も多い所見は、男性で萎縮性胃炎1,858件(36.6%)、女性では胃ポリープ1,032件(33.2%)でした。
要受診・要精密検査となった所見で最も多かったのは、胃食道逆流症21件(0.3%)でした。