


上部消化管X線検査


| 性別 | 年齢 | 受診者数 | 正常者数 A・B判定(%) | 経過観察者数 C0～C12判定(%) | 要精検者数 D判定(%) | 治療中 F判定(%) |
|----|--------|--------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 男性 | 39歳以下 | 1,058 | 869 (82.1) | 185 (17.5) | 4 (0.4) | 0 |
| | 40-49歳 | 2,233 | 1,678 (75.2) | 533 (23.8) | 21(1) (0.9) | 1 (0.1) |
| | 50-59歳 | 2,526 | 1,662 (65.8) | 807 (31.9) | 55(1) (2.2) | 2 (0.1) |
| | 60-69歳 | 1,278 | 671 (52.5) | 571 (44.7) | 35(1) (2.7) | 1 (0.1) |
| | 70歳以上 | 373 | 145 (38.9) | 213 (57.1) | 15(1) (4.0) | 0 |
| 女性 | 39歳以下 | 580 | 453 (78.1) | 119 (20.5) | 8 (1.4) | 0 |
| | 40-49歳 | 1,414 | 1,045 (73.9) | 350 (24.8) | 19 (1.3) | 0 |
| | 50-59歳 | 1,545 | 1,061 (68.7) | 467 (30.2) | 17 (1.1) | 0 |
| | 60-69歳 | 638 | 349 (54.7) | 270 (42.3) | 19 (3.0) | 0 |
| | 70歳以上 | 166 | 76 (45.8) | 82 (49.4) | 8 (4.8) | 0 |
| 計 | | 11,811 | 8,009 (67.8) | 3,597 (30.5) | 201(4) (1.7) | 4 (0.03) |

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は11,811人、このうち要精検者数は201人(1.7%)、治療中は4人(0.03%)でした。



受診者数は11,811人、このうち有所見者数は6,155人(52.1%)。男女とも加齢とともに有所見率が増加しています。



上部消化管X線検査で、1人の食道がんと3人の胃がんが発見されました。

上部消化管X線検査における要受診・要経過観察所見

| 部位 | 所見 | 男性 7,468人 | | 女性 4,343人 | | 合計 11,811 人 | |
|------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) |
| 食道 | 食道炎 | 6 (0.1) | 21 (0.3) | 0 | 2 (0.1) | 6 (0.1) | 23 (0.2) |
| | 食道びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食道潰瘍 | 6 (0.1) | 0 | 1 (0.02) | 0 | 7 (0.1) | 0 |
| | 食道潰瘍癒痕 | 1 (0.01) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.01) | 0 |
| | 食道陥凹性病変 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 食道ポリープ | 3 (0.04) | 26 (0.3) | 1 (0.02) | 16 (0.4) | 4 (0.03) | 42 (0.4) |
| | 食道粘膜下腫瘍 | 0 | 4 (0.1) | 0 | 1 (0.02) | 0 | 5 (0.04) |
| | 食道隆起性病変 | 8(1) (0.1) | 5 (0.1) | 4 (0.1) | 0 | 12(1) (0.1) | 5 (0.04) |
| | 食道裂孔ヘルニア | 1 (0.01) | 133 (1.8) | 1 (0.02) | 30 (0.7) | 2 (0.02) | 163 (1.4) |
| | 胃食道逆流症 | 0 | 1 (0.01) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.01) |
| | アカラシア | 0 | 3 (0.04) | 0 | 0 | 0 | 3 (0.03) |
| | 食道静脈瘤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胃 | 胃がん | 2(2) (0.03) | 0 | 0 | 0 | 2(2) (0.02) | 0 |
| | 胃炎 | 2(1) (0.03) | 1,219 (16.3) | 2 (0.1) | 451 (10.4) | 4(1) (0.03) | 1,670 (14.1) |
| | 萎縮性胃炎 | 10 (0.1) | 36 (0.5) | 4 (0.1) | 18 (0.4) | 14 (0.1) | 54 (0.5) |
| | 化生性胃炎 | 0 | 4 (0.1) | 0 | 0 | 0 | 4 (0.03) |
| | 胃びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃潰瘍 | 5 (0.1) | 0 | 6 (0.1) | 0 | 11 (0.1) | 0 |
| | 胃潰瘍癒痕 | 20 (0.3) | 23 (0.3) | 13 (0.3) | 6 (0.1) | 33 (0.3) | 29 (0.2) |
| | 胃陥凹性病変 | 21 (0.3) | 0 | 1 (0.02) | 0 | 22 (0.2) | 0 |
| | 胃ポリープ | 5 (0.1) | 549 (7.4) | 0 | 597 (13.7) | 5 (0.04) | 1,146 (9.7) |
| | 胃粘膜下腫瘍 | 7 (0.1) | 30 (0.4) | 5 (0.1) | 42 (1.0) | 12 (0.1) | 72 (0.6) |
| | 胃腺腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 胃隆起性病変 | 18 (0.2) | 9 (0.1) | 16 (0.4) | 2 (0.1) | 34 (0.3) | 11 (0.1) |
| | 胃硬化像 | 7 (0.1) | 3 (0.04) | 2 (0.1) | 2 (0.1) | 9 (0.1) | 5 (0.04) |
| | 胃巨大粘膜ひだ | 0 | 2 (0.03) | 1 (0.02) | 0 | 1 (0.01) | 2 (0.02) |
| 十二指腸 | 十二指腸びらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 十二指腸潰瘍 | 2 (0.03) | 0 | 0 | 0 | 2 (0.02) | 0 |
| | 十二指腸潰瘍癒痕 | 1 (0.01) | 120 (1.6) | 1 (0.02) | 34 (0.8) | 2 (0.02) | 154 (1.3) |
| | 十二指腸ポリープ | 0 | 14 (0.2) | 1 (0.02) | 12 (0.3) | 1 (0.01) | 26 (0.2) |
| | 十二指腸粘膜下腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 十二指腸腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 十二指腸隆起性病変 | 3 (0.04) | 7 (0.1) | 1 (0.02) | 0 | 4 (0.03) | 7 (0.1) |
| | リンパ過形成(十二指腸) | 0 | 3 (0.04) | 0 | 4 (0.1) | 0 | 7 (0.1) |

赤字はがん発見数

上部消化管X線検査の受診者数は11,811人、このうち男性7,468人、女性4,343人でした。所見としては、男性は胃炎が最も多く1,219人(16.3%)、女性はポリープが最も多く597人(13.7%)でした。


上部消化管X線検査受診者のうち、がん発見数は4人(0.03%)で、食道がん1人、胃がん3人でした。

上部消化管内視鏡検査

| 性別 | 年齢 | 受診者数 | 正常者数 A・B判定(%) | 経過観察者数 C0～C12判定(%) | 要精検者数 D判定(%) | 治療中 F判定(%) |
|----|--------|-------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 男性 | 39歳以下 | 375 | 201 (53.6) | 173 (46.1) | 1 (0.3) | 0 |
| | 40-49歳 | 1,306 | 636 (48.7) | 660 (50.5) | 10 (0.8) | 0 |
| | 50-59歳 | 1,872 | 686 (36.6) | 1,156 (1) (61.8) | 27 (2) (1.4) | 3 (0.2) |
| | 60-69歳 | 1,204 | 301 (25.0) | 886 (73.6) | 15 (2) (1.2) | 2 (0.2) |
| | 70歳以上 | 787 | 151 (19.2) | 621 (78.9) | 15 (2) (1.9) | 0 |
| 女性 | 39歳以下 | 236 | 161 (68.2) | 71 (30.1) | 3 (1.3) | 1 (0.4) |
| | 40-49歳 | 866 | 572 (66.1) | 287 (33.1) | 7 (0.8) | 0 |
| | 50-59歳 | 1,256 | 695 (55.3) | 549 (43.7) | 10 (1) (0.8) | 2 (0.2) |
| | 60-69歳 | 714 | 284 (39.8) | 427 (59.8) | 3 (0.4) | 0 |
| | 70歳以上 | 370 | 91 (24.6) | 273 (73.8) | 6 (2) (1.6) | 0 |
| 計 | | 8,986 | 3,778 (42.0) | 5,103 (1) (56.8) | 97 (9) (1.1) | 8 (0.09) |

赤字はがん発見数

上部消化管内視鏡検査の受診者数は8,986人、このうち男性5,544人、女性3,442人でした。要精検者数は男性68人(1.2%)、女性29人(0.8%)、計97人(1.1%)でした。がん発見数は10人(0.11%)で、喉頭がん1人、食道がん2人、胃がん6人、十二指腸がん1人でした。



受診者数は8,986人、このうち有所見者数は5,208人(58.0%)。70歳以上の男性の有所見率(80.8%)が最も高い結果となりました。

上部消化管内視鏡検査における要受診・要経過観察所見(一次検査)

| 部位 | 所見 | 男性 5,544人 | | 女性 3,442人 | | 合計 8,986人 | |
|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| | | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) | 要受診(%) | 経過観察(%) |
| 食道 | 食道がん | 1(1) (0.02) | 0 | 1(1) (0.03) | 0 | 2(2) (0.02) | 0 |
| | 食道腫瘍 | 1 (0.02) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.01) | 0 |
| | 食道炎 | 0 | 21 (0.4) | 1 (0.03) | 13 (0.4) | 1 (0.01) | 34 (0.4) |
| | 食道びらん | 0 | 2 (0.04) | 0 | 2 (0.06) | 0 | 4 (0.04) |
| | 食道ポリープ | 0 | 8 (0.1) | 0 | 3 (0.09) | 0 | 11 (0.1) |
| | 食道粘膜下腫瘍 | 1 (0.02) | 24 (0.4) | 0 | 16 (0.5) | 1 (0.01) | 40 (0.4) |
| | 食道隆起性病変 | 2 (0.04) | 9 (0.2) | 0 | 3 (0.09) | 2 (0.02) | 12 (0.1) |
| | 食道裂孔ヘルニア | 0 | 105 (1.9) | 0 | 36 (1.0) | 0 | 141 (1.6) |
| | 胃食道逆流症 | 17 (0.3) | 850 (15.3) | 2 (0.06) | 173 (5.0) | 19 (0.2) | 1023 (11.4) |
| | パレット上皮 | 0 | 60 (1.1) | 0 | 23 (0.7) | 0 | 83 (0.9) |
| | 食道静脈瘤 | 1 (0.02) | 1 (0.02) | 0 | 1 (0.03) | 1 (0.01) | 2 (0.02) |
| | 食道カンジタ | 0 | 5 (0.09) | 0 | 1 (0.03) | 0 | 6 (0.07) |
| | *喉頭ポリープ | 1(1) | | | | 1(1) | |
| 胃 | 胃がん | 2(2) (0.04) | 0 | 0 | 0 | 2(2) (0.02) | 0 |
| | 胃炎 | 1 (0.02) | 915 (16.5) | 2 (0.06) | 393 (11.4) | 3 (0.03) | 1,308 (14.6) |
| | 萎縮性胃炎 | 2 (0.04) | 1,747 (31.5) | 5 (0.1) | 882 (25.6) | 7 (0.08) | 2,629 (29.3) |
| | 化生性胃炎 | 1 (0.02) | 166 (3.0) | 0 | 48 (1.4) | 1 (0.01) | 214 (2.4) |
| | 胃びらん | 1(1) (0.02) | 71 (1.3) | 1 (0.03) | 30 (0.9) | 2(1) (0.02) | 101 (1.1) |
| | 胃潰瘍 | 7 (0.1) | 2 (0.04) | 4 (0.1) | 1 (0.03) | 11 (0.1) | 3 (0.03) |
| | 胃潰瘍癒痕 | 0 | 83 (1.5) | 1 (0.03) | 28 (0.8) | 1 (0.01) | 111 (1.2) |
| | 胃陥凹性病変 | 5(1) (0.09) | 25 (0.5) | 1(1) (0.03) | 6 (0.2) | 6(2) (0.07) | 31 (0.3) |
| | 胃ポリープ | 2 (0.04) | 259 (4.7) | 1 (0.03) | 126 (3.7) | 3 (0.03) | 385 (4.3) |
| | 胃粘膜下腫瘍 | 0 | 265 (4.8) | 3 (0.09) | 180 (5.2) | 3 (0.03) | 445 (5.0) |
| | 胃腺腫 | 0 | 3 (0.05) | 0 | 1 (0.03) | 0 | 4 (0.04) |
| | 胃隆起性病変 | 5 (0.09) | 20(1) (0.4) | 0 | 9 (0.3) | 5 (0.06) | 29(1) (0.3) |
| | 胃腫瘍 | 1 (0.02) | 0 | 0 | 0 | 1 (0.01) | 0 |
| | 胃黄色腫 | 0 | 3 (0.05) | 0 | 0 | 0 | 3 (0.03) |
| 十二指腸 | 十二指腸炎 | 2 (0.04) | 40 (0.7) | 1 (0.03) | 10 (0.3) | 3 (0.03) | 50 (0.6) |
| | 十二指腸びらん | 2 (0.04) | 86 (1.6) | 1 (0.03) | 22 (0.6) | 3 (0.03) | 108 (1.2) |
| | 十二指腸潰瘍 | 1 (0.02) | 0 | 0 | 1 (0.03) | 1 (0.01) | 1 (0.01) |
| | 十二指腸潰瘍癒痕 | 0 | 86 (1.6) | 0 | 31 (0.9) | 0 | 117 (1.3) |
| | 十二指腸ポリープ | 0 | 77 (1.4) | 0 | 26 (0.8) | 0 | 103 (1.1) |
| | 十二指腸粘膜下腫瘍 | 0 | 27 (0.5) | 0 | 8 (0.2) | 0 | 35 (0.4) |
| | 十二指腸隆起性病変 | 1 (0.02) | 4 (0.07) | 1(1) (0.03) | 2 (0.06) | 2(1) (0.02) | 6 (0.07) |
| | ファーター乳頭腫大 | 1 (0.02) | 0 | 0 | 1 (0.03) | 1 (0.01) | 1 (0.01) |
| | 十二指腸のう腫 | 0 | 10 (0.2) | 0 | 1 (0.03) | 0 | 11 (0.1) |
| | リンパ過形成(十二指腸) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

赤字はがん発見数

上部消化管内視鏡検査の受診者は8,986人、このうち男性5,544人、女性3,442人でした。所見としては、男性女性ともに萎縮性胃炎が最も多く、男性1,747人(31.5%)、女性882人(25.6%)に認められました。要受診となった所見で最も多かったのは、胃食道逆流症19人(0.2%)でした。喉頭がんが1人に発見されました。